

2016年薬学部第3問

- 3 次の  にあてはまる式を記入せよ.

空間の異なる3点O, A, Bに対して,  $\vec{a} = \overrightarrow{OA}$ ,  $\vec{b} = \overrightarrow{OB}$ とおく. 線分ABを $k:l$ に内分する点をCとおくと

$$\overrightarrow{OC} = \boxed{\text{ア}} \vec{a} + \boxed{\text{イ}} \vec{b}$$

と表される. また, 線分ABを $m:n$  ( $m > n$ )に外分する点をDとおくと

$$\overrightarrow{OD} = \boxed{\text{ウ}} \vec{a} + \boxed{\text{エ}} \vec{b}$$

と表される. さらに,  $pm - qn \neq 0$ をみたす正の数p, qについて,  $\overrightarrow{OA'} = p\vec{a}$ ,  $\overrightarrow{OB'} = q\vec{b}$ をみたす2点A', B'をとり, 直線OC, ODがそれぞれ直線A'B'と交わる点をC', D'とおくと  $\overrightarrow{OC'}$ ,  $\overrightarrow{OD'}$ はそれぞれ

$$\overrightarrow{OC'} = \boxed{\text{オ}} \vec{a} + \boxed{\text{カ}} \vec{b}, \quad \overrightarrow{OD'} = \boxed{\text{キ}} \vec{a} + \boxed{\text{ク}} \vec{b}$$

と表される. よって, C'は線分A'B'を  :  に内分する点で, D'は線分A'B'を  :  に外分する点である.

ここで, 点Cが線分ABを内分する比の値 $\frac{k}{l}$ と, 点Dが線分ABを外分する比の値 $\frac{m}{n}$ について, これら2つの比の商を

$$c(A, B, C, D) = \frac{\frac{k}{l}}{\frac{m}{n}} = \frac{kn}{lm}$$

とおくとき, 点C'が線分A'B'を内分する比の値と点D'が線分A'B'を外分する比の商 $c(A', B', C', D')$ は,  $k, l, m, n$ を用いると  と表せる.